

# NEOCOCIL

## FICHA TÉCNICA SENASA Certificado N°: 06-105

### Anti-Protozoario - Anti-Coccidiano.

#### COMPOSICIÓN:

Cada 100ML contiene:

Diclazuril.....1g

Agentes de Formulación c.s.p.....100ml

#### INDICACIONES:

Tratamiento y control epidemiológico de coccidiosis en caninos, felinos, porcinos, aves y conejos.

#### DOSIFICACIÓN:

En todas las especies indicadas se debe confirmar previamente el diagnóstico de coccidiosis antes del tratamiento. Se suministra por vía oral directamente o diluido en agua de bebida, según lo indicado en la siguiente tabla:

ESPECIE	CONEJOS	AVES	LECHONES	CANINOS FELINOS
Oral directa con jeringa dosificadora	0,1 ml x kg de peso (1mg/kg)	0,1 ml x kg de peso (1mg/kg)	2,5 ml x kg de peso (25mg/kg)	0,5 ml x kg peso (5mg/kg)
Oral directa con gotero	2 gotas por 2kg de peso (1mg/kg)	2 gotas por 2kg de peso (1mg/kg)		10 gotas x kg de peso
En el agua de bebida	0,3 a 0,5 ml x litro de agua (3 a 5 ppm)	0,3 a 0,5 ml x litro de agua (3 a 5 ppm)		1,5 a 2,5 ml x litro de agua (15 a 25 ppm)

#### CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES DE USO:

No se han descripto.

#### PRECAUCIÓN:

En caso que el producto sea suministrado disuelto en el agua de bebida, se debe desestimar el remanente después de 24hs de mezclado

#### PERÍODO DE RESTRICCIÓN PRE-FAENA:

A 5 días. No suministrar a ponedoras de huevos en producción

#### PRESENTACIÓN:

Gotero de 10 ml, botella de 100 ml y 1000ml.

Conservar el producto entre 15° y 25° C

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

USO VETERINARIO - Industria Argentina

VENTA BAJO RECETA

Est. Elab. N° 7858 para KW SRL

DIRECTOR TÉCNICO:

Daniel A Lauría. Médico Veterinario - Mat. 475

Para control epidemiológico de esta parasitosis, se aconseja el suministro del producto a las siguientes edades: caninos, felinos, aves y conejos entre la 3ª y 5ª semana de vida; lechones 1ª semana de vida. En todos los casos corresponde suministrar una dosis. En caso de una alta presión parasitaria, repetir el tratamiento entre 2 y 3 semanas después.



[www.laboratoriokw.com.ar](http://www.laboratoriokw.com.ar)



[infokw@laboratoriokw.com.ar](mailto:infokw@laboratoriokw.com.ar)



Derqui 6940, Rosario, Santa Fe



+54 341 4575598



+54 9 341 5089612



Laboratorio KW